

Journée mondiale contre le SIDA - 1er Décembre

Questionnaire anonyme

1. Ce sont des IST ?

(Infections Sexuellement Transmissibles)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Syphilis | <input type="checkbox"/> Hépatite A |
| <input type="checkbox"/> Chlamydiae | <input type="checkbox"/> Hépatite B |
| <input type="checkbox"/> SIDA | <input type="checkbox"/> Hépatite C |
| <input type="checkbox"/> Herpès | <input type="checkbox"/> Morpions |
| <input type="checkbox"/> Choude-pisse (blennorragie) | |

2. Dans quels cas y a-t-il un risque de transmission du VIH et/ou IST ?

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| VIH | IST | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Masturbation, caresses |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S'embrasser |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fellation, cunnilingus, anulingus |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pénétration sans préservatif |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Partager une seringue |

3. Que doit-on faire si la capote craque ?

- Aller aux urgences
- Prendre la pilule du lendemain
- Faire un dépistage à 3 mois
- Une capote ne craque pas
- Je ne sais pas

4. On peut lubrifier un préservatif avec :

- Vaseline
- Beurre, huile
- Gel lubrifiant à base d'eau
- Salive
- Je ne sais pas

5. Où peut-on faire un dépistage gratuit ?

- Dans les C.D.A.G
- Dans un laboratoire d'analyse
- À l'infirmierie de la fac
- Je ne sais pas

6. Une campagne de prévention sur le VIH vous a-t-elle marquée ? Laquelle ?

7. Avez-vous déjà utilisé ?

- Une capote
- Une digue dentaire
- Un fémidon (préservatif féminin)
- Du gel lubrifiant à base d'eau

8. Vous protégez vous lorsque vous pratiquez... ?

(Npp : Ne pratique pas)

	Toujours	Souvent	Parfois	Jamais	Npp
Fellation	<input type="checkbox"/>				
Cunnilingus	<input type="checkbox"/>				
Anulingus	<input type="checkbox"/>				
Pénétration :					
- vaginale	<input type="checkbox"/>				
- anale	<input type="checkbox"/>				

9. Etes-vous ?

- Un garçon
- Trans
- Une fille
- Ne sait pas

10. Quel âge avez-vous ? ____

11. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... ?

- Un garçon
- Ne souhaite pas répondre
- Une fille
- N'a jamais eu de relations sexuelles

12. Vous définissez-vous comme ?

- Hétéro
- Homo
- Bi
- Ne sait pas

Journée mondiale contre le SIDA - 1er Décembre

Réponses au questionnaire

1. Ce sont des IST :

Syphilis, Chlamydiae, Hépatite B et C, Choude-Pisse, SIDA, Herpès, morpions sont des Infections Sexuellement Transmissibles (IST). Si vous présentez des symptômes anormaux (brûlures urinaires, écoulements, boutons, gratouille), parlez en à votre médecin. Faites-vous dépister **systématiquement** si vous avez eu des rapports à risque. N'oubliez pas qu'une IST fragilise les muqueuses et peut faciliter le passage du VIH. L'hépatite A n'est pas une IST.

2. Dans quels cas y a-t-il un risque de transmission du VIH et/ou IST ?

Lécher (Fellation/Cuni/Anulingus) : Risque de transmission du VIH, limité mais **existant**, plus élevé en cas de fellation avec éjac'. **Risque élevé pour beaucoup d'autres IST**, qui peuvent fragiliser les muqueuses et faciliter le passage du virus.

⇒ Protection : digue dentaire, capotes pour la fellation.

Pénétration vaginale : Risque très élevé, même sans éjaculation.

⇒ Préservatif indispensable, éventuellement gel en cas de secheresse vaginale.

Pénétration anale : Risque maximal.

⇒ Capote et gel à base d'eau, pour les rapport homos comme pour les hétéros, car le risque de rupture du préservatif est important.

Godes, Sextoys : Risque si il y a échange entre plusieurs partenaires.

⇒ Mettre une capote et la changer à chaque partenaire.

Partager une seringue : Risque majeur.

⇒ **Toujours utiliser une seringue neuve.**

Se masturber, caresses : Risque nul pour le VIH

3. Que faire si la capote craque ?

Aller aux urgences au plus vite, et au maximum 48h après la prise de risque si possible avec votre partenaire, pour rencontrer un médecin qui évaluera les risques et vous prescrira éventuellement un traitement d'urgence qui réduira le risque de contamination par le VIH (sans l'éliminer toutefois). En cas de rapport vaginal, si vous n'utilisez pas d'autres moyens de contraception, prendre la pillule du lendemain, qui s'obtient sans ordonnance, le plus vite possible (l'efficacité décroît avec le temps), et faire un test de grossesse. Dans tous les cas, reprenez une sexualité protégée et faites un test de dépistage à 3 mois.

4. Pour lubrifier un préservatif : Du GEL A BASE D'EAU !!!!

Indispensable en cas de pénétration anale et vaginale (en cas de sécheresse vaginale)

Les substances à base de corps gras : Vaseline, beurre, nutella, chantilly... rendent le latex poreux.

La salive ne suffit pas... et elle abîme le lubrifiant qui est déjà sur le préservatif !

5. Où peut-on faire un test de dépistage gratuit ?

Dépistage gratuite dans tous les CDAG (Centre de Dépistage Anonymes et Gratuits) addresses au stand et sur le site du CRIPS : <http://www.crips.asso.fr/webidf/adresses/cdag.htm>, ou en appelant

SIDA INFO SERVICE
0 800 840 800

Votre médecin peut vous prescrire un test dans un laboratoire d'analyses médicales, remboursé par la sécu, et le planning familial peut vous faire un test mais pas l'infirmierie de la faculté.

Rappelez-vous que, protégée, la sexualité est un plaisir, profitez-en !

Association des jeunes gais, bis, lesbiennes et trans de l'ENS

HomoNormalité

<http://homonormalite.free.fr>
mail : homonormalite@free.fr